

Akciğer Kanserli Hastaların Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Ümmügül Üyetürk, Abdullah Yalçın,
Fatma Akdağ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Giriş

- Akciğer kanseri tüm dünyada sık görülen, en çok ölüme yol açan kanserlerden biri,
- Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmekte,
- Akciğer kanseri gelişiminden %94 oranında sigara sorumlu,
- Hastalarda en uygun tedavi modelinin uygulanabilmesi için alt hücre tipinin belirlenmesi ve doğru bir evreleme yapılması gereklidir.

Materyal-Metod

- Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yeni açılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi onkoloji polikliniğine başvuran akciğer kanserli hastalar retrospektif olarak incelendi.
- Hastaların yaşları, cinsiyetleri, sigara öyküleri, yandaş hastalıkları, histolojileri, evreleri, tedavi seçenekleri değerlendirildi.

Bulgular

- Bu süre içinde polikliniğimize başvuran ve kendisine dosya oluşturulan 521 hastadan 58'inin(%11.1) akciğer kanseri olduğu bulundu.
- Hastaların median yaş 61 ± 7.8 (minumum:45- maksimum:79) yıldı. Hastaların 51'i(%87.9) erkek,7'si(%12.1) kadındı.
- Sigara öyküsü 53(%91.4) hastada mevcuttu.
- Yandaş hastalık 24(%41.4)hastada mevcuttu. En fazla görülen yandaş hastalık 15(%25.8) hastayla hipertansiyondu.

- Hastaların
- 28'i(%48.3) yassı hücreli,
- 19'u(%32.8) adenokarsinom,
- 12'si(%1.7) büyük hücreli karsinom,
- 4'ü (%6.9) alt grubu tayin edilememiş olmak üzere 52'si(%89.7) küçük hücreli dışı histolojiye,
- 6'sı(%10.3) küçük hücreli akciğer karsinomu histolojisine sahipti.


- Küçük hücreli dışı histolojiye sahip olan hastaların 9'u (%17.3) evre 2, 6'sı (%11.5) evre 3A, 8'i (%15.3) evre 3B, **29'u (%55.7) evre 4**,
- Küçük hücreli histolojiye sahip hastalardan 2'si(%33.3)sınırlı evre, **4'ü(%66.7)evre 4** olarak evrelenmişti.
- Toplamda 33'ü(%56.9) metastatik evrede tanı almıştı.

- Metastaz yeri olarak 15'inde (%25.9) çoklu metastaz, 7'sinde(%12.1) kemik, 7'inde (%12.1) plevra metastazı mevcuttu.
- Hastaların ancak 10'u(%17.2) opere edilmişti.
- Hastaların 9'una (%15.5) akciğere küratif, 4'üne(%6.9) kemiğe,3'üne(%5.2) beyine,1'ine (%1.7)beyin ve kemiğe palyatif radyoterapi uygulanmıştı..

- 14 (%24.1) hastaya bifosfanat tedavisi başlanmıřtı.
- Kemoterapi 9'una(%15.5) performası düşük olduđu, 4'üne(%6.8) istemediđi için planlanmamıřtı.
- Birinci sıra kemoterapi olarak en sık planlanan protokol 23(%39.7) hasta ile sisplatin gemitabin kemoterapi protokolüydü.

Sonuç

- Akciğer kanserinin esas tedavisi cerrahidir. Opere olabilecek evredeki her hastada operasyon için şartlar sonuna kadar zorlanmalıdır.
- Radyoterapi ve kemoterapi k ratif ve palyatif tedavide  nemlidir.
- **Ama akciğer kanserini  nlemenin ve belki de tedavi etmenin en  nemli yolu etyolojide  nemli rol oynayan sigaranın bıraktırılmasıdır.**



Teşekkürler.....